

Metronidazol



Metronidazol versterkt het effect van cumarines door remming van het hepatisch metabolisme van cumarines.

Situatie	Actie
1. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: cumarine• start: metronidazol	Bij een eenmalige dosis: geen actie. Melden aan de trombosedienst. Instrueer de patiënt bij staken van metronidazol contact op te nemen met de trombosedienst.
2. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: metronidazol• start: cumarine	Instrueer de patiënt bij staken van metronidazol contact op te nemen met de trombosedienst.
3. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: metronidazol• in gebruik: cumarine	
4. <ul style="list-style-type: none">• staken: metronidazol• in gebruik: cumarine	

5. Actie wanneer de trombosedienst niet bereikbaar is

Metronidazol mag worden afgeleverd.

Zo snel mogelijk of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de voorschrijver van metronidazol over vervanging van metronidazol. Als vervanging niet mogelijk is, melden aan de aan trombosedienst.

6. Overige opmerkingen en aandachtspunten.

Bij een aantal indicaties kan metronidazol worden vervangen door een ander antibioticum.