



Piroxicam versterkt het effect van cumarines. Het mechanisme is nog niet geheel opgehelderd. Daarnaast heeft piroxicam een ulcerogeen effect.

Situatie	Actie
1. <ul style="list-style-type: none"> <li>• in gebruik: cumarine</li> <li>• start: piroxicam</li> </ul>	<p>Niet voorschrijven of afleveren.</p> <p>Uitzondering: bij spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew) of reumatoïde artritis die niet of onvoldoende reageert op andere NSAID's. Neem contact op met de trombosedienst, na contact te hebben gehad met de voorschrijver over het starten van piroxicam.</p> <p>Instrueer de patiënt bij staken van piroxicam contact op te nemen met de trombosedienst.</p>
2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• in gebruik: piroxicam</li> <li>• start: cumarine</li> </ul>	
3. <ul style="list-style-type: none"> <li>• in gebruik: piroxicam</li> <li>• in gebruik: cumarine</li> </ul>	
4. <ul style="list-style-type: none"> <li>• staken: piroxicam</li> <li>• in gebruik: cumarine</li> </ul>	

#### 5. Actie wanneer de voorschrijver van het piroxicam niet bereikbaar is

Piroxicam mag niet worden afgeleverd tenzij de indicatie spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew) of reumatoïde artritis is die niet of onvoldoende reageert op andere NSAID's.

Afhankelijk van de indicatie, vervang piroxicam eventueel door een ander NSAID. Zie hiervoor **NSAID's overige** op pagina 46.

Zo snel mogelijk of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag melden aan de voorschrijver van het piroxicam over vervanging.

Indien piroxicam niet kan worden vervangen, contact opnemen met de trombosedienst met vermelding van de reden van het voorschrijven van piroxicam door de voorschrijver.

#### 6. Overige opmerkingen en aandachtspunten

Analgetische salicylaten en fenylbutazon zijn niet geschikt als alternatief voor een piroxicam. Deze stoffen zijn gecontraïndiceerd.

Piroxicam moet zo min mogelijk worden voorgeschreven aan patiënten die cumarines gebruiken omdat het bloedingsrisico door deze combinatie extrawordt verhoogd.

Als naast een cumarine piroxicam wordt gebruikt, wordt maagprotectie geadviseerd. Op grond van de beschikbare literatuur gaat de voorkeur uit naar een maagprotectief middel zoals een protonpompremmer of misoprostol (800 mcg per dag).

Op [www.fnt.nl](http://www.fnt.nl) is meer informatie over de interactie tussen NSAID's, zoals piroxicam, en cumarine terug te vinden.