

## NSAID's, overige

---

NSAID's beïnvloeden de trombocytenaggregatie en hebben daarnaast een ulcerogeen effect. Hierdoor verhogen NSAID's het bleedingsrisico. Bij sommige mensen wordt ook de INR beïnvloed. Alleen melden bij gebruik van NSAID langer dan 1 week.

Situatie	Actie
1. <ul style="list-style-type: none"><li>• in gebruik: cumarine</li><li>• start: NSAID, langer dan 1 week</li></ul>	Melden, bij gebruik langer dan 1 week, aan de trombosediens. Instrueer de patiënt bij staken van NSAID contact op te nemen met de trombosediens.
2. <ul style="list-style-type: none"><li>• in gebruik: NSAID</li><li>• start: cumarine</li></ul>	Instrueer de patiënt bij staken van NSAID contact op te nemen met de trombosediens.
3. <ul style="list-style-type: none"><li>• in gebruik: NSAID</li><li>• in gebruik: cumarine</li></ul>	
4. <ul style="list-style-type: none"><li>• staken: NSAID</li><li>• in gebruik: cumarine</li></ul>	

### 5. Actie wanneer de trombosediens niet bereikbaar is

Het NSAID mag worden afgeleverd.

Zo snel mogelijk of uiterlijk op de eerstvolgende werkdag melden aan de trombosediens.

### 6. Overige opmerkingen en aandachtspunten

Bij patiënten met een CYP2C9 polymorfisme kan de INR bij gelijktijdig gebruik van een NSAID en een cumarine worden verhoogd.

NSAID's moeten zo min mogelijk worden voorgeschreven aan patiënten die cumarines gebruiken.

NSAID gerelateerde bleedingsrisico is bij deze patiënten extra verhoogd; bovendien kunnen eventueel door het NSAID optredende bleedingen ernstiger verlopen bij gelijktijdig gebruik van cumarines.

Als naast een cumarine een NSAID wordt gebruikt, wordt maagprotectie geadviseerd. Op grond van de beschikbare literatuur gaat de voorkeur uit naar een maagprotectief middel zoals een protonpompremmer of misoprostol (800 mcg per dag).

Fenylbutazon, piroxicam, acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium in analgetische dosering zijn niet geschikt als alternatief. Deze stoffen zijn gecontraïndiceerd.

NSAID's die langer dan 1 week zijn voorgeschreven, moeten worden gemeld aan de trombosediens.

Voor meer informatie over interactie NSAID – cumarine zie het document 'De Interactie tussen cumarines en NSAID's' op [www.fnt.nl](http://www.fnt.nl).