



Een aantal 'nibben' zoals dabrafenib erlotinib, gefitinib en sorafenib beïnvloeden het effect van cumarines. Hierdoor neemt de stollingstijd toe of af.

Situatie	Actie
1. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: cumarine• start: dabrafenib/ erlotinib/ gefitinib/ sorafenib	Het continueren van het cumarine is een beslissing die door de oncoloog of ander behandelend arts in samenspraak met de trombosedienst wordt genomen.
2. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: dabrafenib/ erlotinib/ gefitinib/ sorafenib• start: cumarine	Als het een veneuze tromboembolie betreft t.g.v. een complicatie bij maligniteit, start met LMWH gedurende de 6 maanden. Als na 6 maanden nog steeds een antistollingsmiddel is geïndiceerd, kan het LMWH door een cumarine worden vervangen.
3. <ul style="list-style-type: none">• in gebruik: dabrafenib/ erlotinib/ gefitinib/ sorafenib• in gebruik: cumarine	Bij staken van het dabrafenib/ erlotinib/ gefitinib/ sorafenib dient dit door de oncoloog, de apotheek of eventueel door de patiënt te worden doorgegeven aan de trombosedienst.
4. <ul style="list-style-type: none">• staken: dabrafenib/ erlotinib/ gefitinib/ sorafenib• in gebruik: cumarine	

5. **Actie wanneer de voorschrijver van het interacterend geneesmiddel of de trombosedienst niet bereikbaar zijn**

In principe overlegt de oncoloog met de behandelend arts (trombosedienst) of een cumarine moet worden gecontinueerd of niet.

6. **Overige opmerkingen en aandachtspunten**

In de CBO richtlijn *Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie arteriële trombose* worden patiënten met maligniteiten die een veneuze trombose krijgen behandeld met LMWH. Als na 6 maanden de behandeling nog noodzakelijk is, wordt veelal overgestapt op een cumarine.

Bij patiënten die op een cumarine staan en daarnaast behandeld worden met oncologische middelen zal de oncoloog overleg moeten plegen met de behandelend arts (trombosearts) of patiënt op cumarine blijft of wordt overgezet op LMWH. Als wordt besloten met de behandeling met een cumarine te continueren, zal de trombosedienst intensiever moeten controleren.

Niet alleen de oncologische middelen maar ook het onderliggend lijden geven kan de INR ontregelen.

Meer informatie

Op de site www.oncotherapie.nl (medicatiebewaking) is meer informatie over de interactie tussen de afzonderlijke oncologische middelen en een cumarine te vinden. Hiervoor is een gratis aan te vragen wachtwoord nodig.